

MMPI测试103例凶杀罪犯的分析

赵晓霞 金生荣

耿德勤 晏明佑 庄柏翔

(江苏省第四监狱医院 221006) (心理测量与咨询中心)

明尼苏达多相个性调查表 (MMPI) 自本世纪40年代初由美国心理学家Halthaway和Mekinley制定, 1989年在我国标准化后, 得到广泛地应用, 并在许多特殊人群被测试和研究, 证实MMPI具有重要的实际意义。本文总结103例凶杀罪犯以中国T分为标准的MMPI使用情况, 探讨凶杀罪犯的个性特征, 现将结果报告如下。

1 材料和方法

1.1 材料 共103例, 均为男性, 年龄19~46岁, 平均 27.2 ± 6.8 岁。文化程度: 初中86人, 高中 (包括中专) 14人, 大专3人。职业: 工人56人, 农民14人, 干部6人, 学生3人, 个体户3人, 无职业者22人。婚姻: 未婚50人, 已婚48人, 离异3人。所有凶杀罪犯均被判20年以上刑期, 其中死刑缓期执行者数人, 无期徒刑38人。

以宋维真主持修订的《明尼苏达多相个性测试表使用指导书》中“男性常模”为对照^[1], 并进行统计学检验。

1.2 方法 按“使用指导书”要求和标准进行。所有受试者皆一次完成566题MMPI和MMPI-2问卷。测试前由作者向受试者讲明情况, 负责保密, 允许不写姓名, 希望他们消除顾虑, 如实答卷, 尽量排除精神紧张。评分使用套板法, 计算各表的原始分数。

2 结果

所有103例罪犯的MMPI答卷均有效。从MMPI原始分数和中国T分结果可以看出 (附表)。

附表 杀人犯MMPI原始分和中国T分 ($\bar{X} \pm S$)

项目	杀人犯 (n=103)	全国常模
说谎 (L)	$5.12 \pm 2.69^*$	5.70 ± 2.52
装坏 (F)	$16.34 \pm 7.34^{**}$	13.68 ± 6.86
防御 (K)	$10.99 \pm 4.59^{**}$	13.00 ± 4.66
疑病 (Hs)	$11.68 \pm 5.66^{**}$	8.78 ± 4.75
抑郁 (D)	25.69 ± 5.32	26.16 ± 4.90
癔症 (Hy)	$16.76 \pm 4.94^{**}$	22.07 ± 5.36
病态人格 (Pd)	$23.60 \pm 5.32^{**}$	18.98 ± 4.36
男性女性化 (Mfm)	$25.20 \pm 4.49^{**}$	27.56 ± 4.04
偏执妄想 (Pa)	$16.55 \pm 4.29^{**}$	12.84 ± 3.92
精神衰弱 (Pt)	$24.97 \pm 7.54^{**}$	17.86 ± 7.93
精神分裂 (Sc)	$33.12 \pm 9.86^{**}$	23.01 ± 10.15
躁狂 (Ma)	$21.55 \pm 4.68^{**}$	18.48 ± 5.26
社会内向 (Si)	34.40 ± 7.41	34.51 ± 6.88

* $P < 0.05$ ** $P < 0.001$

2.1 除D、Si量表外, 效度量表L、F、K, 临床量表Hs、Hy、Pd、Mfm、Pa、Pt、Sc、Ma均与常模有显著性差异 ($P < 0.001$)。其中, 效度量表K和临床量表Hy、Mfm显著低于常模分数。

2.2 凶杀罪犯组中国T分60以上的有Pd、Pa、Pt、Sc等4个量表, 而Hs、Ma仅达55分。所有量表没有显著超过60分者。

3 讨论

MMPI是目前临床上最常用的人格测验工具, 也是研究罪犯人格特征的常用心理学工具之一。国内外许多资料表明, 违法犯罪者的个性与正常人群有差异^[2-3], 但应用该量表及中国T分测查杀人犯者个性的研究则未见报告。本组资料显示, 杀人犯 (各种

致被害人重伤或死亡)在判刑后的MMPI中国T分绝大多数量表显著高于或低于正常对照。但以T分60为异常分界,则仅Pd、Pa、Pt、Sc达到60分,呈“46”、“47”或“48”编码,反映此类罪犯有类似精神病性格特点。

变态人格(Pd)量表分提高,往往表现反抗社会、家庭的倾向,在遵守制度和法律上有困难和个性的障碍,自控能力差,易破坏社会和家庭关系,并违反法律。妄想偏执(Pa)分的提高,提示罪犯多疑、警惕和烦恼,过份敏感或认罪不足,存在幻想,其行为可能是敌意和好争论或侵犯他人。精神衰弱(Pt)分在杀人犯中显著升高,显示他们紧张、焦虑、反复思考,有强迫思想、恐怖

情绪。由于他们多数系无期徒刑,不伴抑郁分(D)升高,因此主要存在强迫观念和动作。精神分裂(Sc)分显著升高,则显示罪犯思维混乱、情绪易变,有脱离现实的体验与幻想。女性化(Mfm)和癔病(Hy)分数降低,提示他们好攻击、粗鲁、爱冒险、好实践和粗心大意,又自作主张、缺乏兴趣、心理修养较低。

从本研究资料可以看出,杀人犯男性群体具有较显著偏离正常人群的个性,具有变态人格、类精神病的人格特征。当然,测查均在判刑之后,具有一定的限制。由于我们测查的对象为凶杀罪犯,又以中国T分为标准,故与国内王春芳等人资料不尽相同,后者大多为性犯罪,且刑期较短^[3]。

参 考 文 献

- 1 宋维真.明尼苏达多相个性调查表使用指导书.北京:中国科学院心理所,1989
- 2 张伟,等.卖淫青少年妇女MMPI测试结果的聚类分析.中国心理卫生杂志,1993,7(3):135
- 3 王春芳,等.MMPI测试100例罪犯的分析.中华神经精神科杂志,1987,20(3):142
(1993-02-28 收稿)

(上接第185页)

检也仅注意一般项目的检查,而致误诊,本组1例在外院误诊为风湿性心脏病达2年之久。

2.2 早期诊断的几点建议 首先要对本病有一定的认识,其次对有高血压者应注意其

它肢体的血压,有心脏症状者应常规注意血压及脉搏、血管杂音,再次如仅有非特异症状时应注意体格检查要仔细,特别是血管杂音(腹部、锁骨上、颈腰背部,股动脉血管区)。

参 考 文 献

- 1 郑德珍,等.大动脉炎46例.中华儿科杂志,1984,22:87
- 2 诸君龙.多发性大动脉炎.上海医学,1978,9:617
(1993-03-17 收稿)